

Que faire en cas d'auto-injection accidentelle d'un vaccin aviaire ?

Si vous êtes victime d'une auto-injection accidentelle de vaccin aviaire, même si la dose injectée est très faible, **consultez rapidement** en vous munissant de la notice du vaccin.

À L'ATTENTION DE LA PERSONNE INJECTÉE ACCIDENTELLEMENT

1



Arrêter **immédiatement** la vaccination

2



Retirer alliance et autres bagues

3



Laver la plaie au savon

4



Faire tremper votre main dans un bain d'antiseptique non coloré pendant 15 minutes

5



Mettre de la glace sur la zone d'injection

6



Récupérer la notice du vaccin

7



Consulter en urgence un centre spécialisé de la main

liste FESUM, Fédération des services d'urgences de la main

[> cliquer ici pour accéder au site](#)

8



Déclarer cette exposition au service pharmacovigilance vétérinaire du laboratoire concerné. Pour Boehringer Ingelheim Santé Animale, le numéro à contacter est le **04 72 72 30 00**.

ATTENTION

Ce médicament vétérinaire peut contenir de l'huile minérale.

Même avec une plaie d'apparence minime, une faible quantité de ce produit (auto) injectée accidentellement peut provoquer un œdème intense et une nécrose irréversible pouvant conduire, en cas de retard thérapeutique, à **l'amputation d'un doigt**. Il est impératif de recourir **immédiatement** à des soins chirurgicaux dispensés par un spécialiste. Une incision et une irrigation rapides de la zone injectée peuvent s'avérer nécessaires, notamment si les tissus mous ou le tendon d'un doigt sont touchés.

À L'ATTENTION DU MÉDECIN



Recourir **immédiatement** à des soins chirurgicaux



Nettoyer soigneusement au savon et désinfecter avec un désinfectant incolore la zone d'injection



Vérifier la validité de la vaccination antitétanique



Référer le patient **en urgence** vers un centre spécialisé (ou clinique) de la main
[> cliquer ici pour accéder au site](#)



Comme pour toute plaie, prévenir et surveiller le risque infectieux



 **Boehringer Ingelheim**