

N°7
27 mars
2017

Les Sommes de températures

Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France)

Secteur	Station météo	Altitude	2017	2016 rappel
Causse central	Lunegarde	383 m	486	370
Bouriane	Gourdon	260 m	509	402
Quercy Blanc	Le Montat	260 m	517	424
Figeacois et Limargue	Faycelles	342 m	497	351
Causse de Limogne	Villefranche de R. / Le Montat	290 m	494	393
Vallée de la Dordogne	Branceille	190 m	510	407
Ségala ouest	Comiac	562 m	423	291
Ségala est	Aurillac	623 m	392	252

Pâturage tournant et hauteur d'herbe

En pâturage tournant, au printemps, le changement de paddock se fait lorsque la hauteur d'herbe est réduite par le pâturage à 5 cm. Le lot d'animaux doit pâturer entre 3 à 5 jours grand maximum par paddock ! Si au bout de 5 jours, le pâturage n'est pas terminé, c'est que la surface est trop grande ou le lot d'animaux trop petit.

Astuce : Placer une botte de bon foin dans le paddock. Tant que l'herbe est suffisante, les animaux n'y touchent pas car l'herbe feuillue est plus appétente que le foin. Dès que les animaux commencent à manger le foin, c'est qu'ils ont consommé toutes les feuilles de la prairie et qu'il ne reste que les gaines, peu appétentes. C'est le moment de changer de paddock ! Cette méthode permet de ne pas sur-pâturer et favoriser la repousse de l'herbe.

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois Fin du déprimage

Nous avons environ 12 jours d'avance par rapport à la moyenne, les 500 degrés-jours sont atteints ou le seront bientôt, **il faut arrêter le déprimage sur les prairies précoces destinées à la fauche en foin pour ne pas couper l'épi en cours de montaison.** Le déprimage est possible jusqu'à 700 degrés jours sur les prairies tardives.

Prévisions de date d'atteinte des 500 degrés-jours :

- Quercy Blanc : **Atteint depuis le 25 mars**
- Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : **Atteint**
- Causse central, Figeacois et Limargue : Le 30 mars

Contrairement aux prairies fauchées, il est à noter que sur les prairies en pâturage tournant, sectionner l'épi est bénéfique car cela permet une repousse feuillue pour le second cycle.

Ségala Pâturage !

Les animaux doivent être à l'herbe ! **Il est important de ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm de hauteur d'herbe pour favoriser une repousse rapide.**

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - tel 05 65 23 22 22
ou votre conseiller de secteur