

Suite à la sécheresse, établir un premier bilan de l'état des prairies

La sécheresse et les fortes températures de cet été peuvent avoir altéré certaines prairies. Un diagnostic de l'état de la flore sera nécessaire **au moment du reverdissement**.

Astuce pour préserver les prairies des fortes températures estivales : Laisser un peu de hauteur d'herbe sur la dernière coupe avant l'été (au moins 10 à 15 cm) en fauchant haut ou en enlevant les animaux au pâturage plus tôt. Cela permettra un peu d'ombrage au sol et aura un effet « isolant » qui protégera les systèmes racinaires des chaleurs extrêmes de l'été et aidera à la pérennité des prairies. Cette herbe sèche laissée sur pied pourra être pâturée à l'automne.

Diagnostic et interventions à prévoir Que faire selon l'état de la prairie ?

Les zones de terre nue sont importantes et commencent à se salir ? Au moment du reverdissement, les espèces fourragères semblent ne pas repartir et les mauvaises herbes apparaissent ? Il est conseillé de faire un premier bilan de l'état de ces prairies afin d'anticiper les interventions d'automne. Parcourir la parcelle et prélever une poignée d'herbe en 10 points différents. Éviter les entrées de parcelles et la proximité des points d'eau où la flore est souvent différente et veiller à bien répartir les prélèvements en tenant compte des hétérogénéités. Dans chaque prélèvement, noter les espèces identifiées (espèces fourragères productives, graminées non souhaitées et mauvaises herbes) afin d'établir le bilan en « % de graminées et légumineuses fourragères » et « % de dicotylédones indésirables ». Prendre également en compte l'importance des surfaces en terre nue.

Dicotylédones indésirables	% de bonnes graminées et légumineuses fourragères		
	Moins de 30 %	30 à 70 %	Plus de 70 %
Moins de 15 %	Rénovation ou sur-semis	Amélioration Fertilisation adaptée et pratiques d'exploitation	Bonne prairie
15 à 30 %			Bonne prairie Désherbage sélectif
Plus de 30 %	Rénovation	Amélioration Fertilisation adaptée et pratiques d'exploitation + Désherbage sélectif	

Amélioration : Remise en production d'une prairie peu dégradée par une fertilisation adaptée et le respect des bonnes pratiques d'exploitation. L'amélioration sera progressive.

Sur-semis : Semis sur la prairie en place à l'aide d'un matériel adapté (semoir direct, herse étrille équipée d'un semoir Venturi), avec ou sans désherbage sélectif. La production de la prairie ne sera pas ou peu interrompue. La fertilité du sol est un élément important de la réussite car les nouvelles plantes sur-semées souffriront d'une forte concurrence. Choisir des espèces agressives en fonction du mode d'exploitation :

- **Pâturage :** Ray-grass hybride ou anglais, trèfle blanc
- **Fauche :** Ray-grass d'Italie ou hybride, brome, trèfle violet

Rénovation : Destruction et nouveau semis si la prairie est trop fortement dégradée.

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - tel 05 65 23 22 22
ou votre conseiller de secteur