N°3 - 31 mars 2022

Les Sommes de températures

Degrés-jours cumulés à partir du 1er février *(source : Météo-France)*

Secteur	Station météo	Altitude	2022	*2021 rappel*
Causse central	Lunegarde	383 m	**505**	*504*
Bouriane	Gourdon	260 m	**538**	*540*
Vallée de la Dordogne	Bretenoux	138 m	**485**	
Quercy Blanc	Le Montat	260 m	**533**	*537*
Figeacois et Limargue	Faycelles	342 m	**522**	*525*
Causse de Limogne	Villefranche de R. / Le Montat	290 m	**520**	*525*
Ségala ouest	Comiac	562 m	**448**	*451*
Ségala est	Aurillac	623 m	**407**	*402*

Déprimage des surfaces de fauche

Le déprimage consiste à faire pâturer les parcelles destinées à la fauche sans pénaliser le rendement, les animaux consommant l'herbe d'hiver. Faire déprimer favorise le tallage, permet de nettoyer les parcelles et d'éliminer l'herbe agée, tout en limitant l'utilisation des stocks par l'augmentation de la surface de pâture. Le déprimage peut débuter dès que l'herbe atteint 8 cm de hauteur. Il ne faut pas faire déprimer plus bas que 5 cm pour ne pas sectionner les épis en cours de montaison. Pour ne pas pénaliser les rendements foins, le déprimage devra être arrêté avant le stade « épi 5 cm » (5 cm de hauteur entre le plateau de tallage et la pointe de l'épi), stade atteint vers 500 degrés-jours pour les prairies précoces et vers 700 degrés-jours pour les prairies tardives. Si l'épi est sectionné, la repousse est feuillue mais le rendement foin sera impacté.

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois

Fin du déprimage

Les 500 degrés-jours sont atteints, marquant la fin du déprimage sur les prairies précoces destinées à la fauche en foin, pour ne pas couper l'épi en cours de montaison. **Le déprimage est toujours possible jusqu'à 700 degrés jours sur les prairies tardives.** Un passage de herse est à prévoir pour écarter les bouses à la sortie de la parcelle des animaux.

Ségala

Bientôt la fin du déprimage

les 500 degrés-jours seront bientôt atteints, **marquant la fin du déprimage sur les prairies précoces destinées à la fauche en foin, pour ne pas couper l'épi en cours de montaison.** Le déprimage est possible jusqu'à 700 degrés jours sur les prairies tardives.

Prévisions de date d'atteinte des 500 degrés-jours :

- **Ségala ouest (Comiac) :** Le 8 avril
- **Ségala est (Aurillac) :** Vers le 15 avril

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - 05 65 23 22 22

La Chambre d'Agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Égalité Fraternité

Pour recevoir ce bulletin par e-mail, écrivez à : herbe@lot.chambagri.fr

Retrouvez les Bulletins Herbe & Fourrages sur : www.lot.chambagri.fr

Campagnols

Et si le renard était la plus simple des solutions ?

Chaque année, de nombreuses prairies sont fortement dégradées par le campagnol des champs *(Microtus arvalis)* et le campagnol terrestre *(Arvicola terrestris)* dans les régions de moyenne montagne, et le changement climatique semble accélérer ce phénomène. Les dégâts affectent la production fourragère, quantitativement et qualitativement. Le campagnol terrestre s'en prend aussi aux racines des arbres fruitiers.

La vie du campagnol se passe essentiellement sous terre, où il se nourrit de racines (il consomme tous les jours son poids en racines) et de graines. Il creuse ses galeries avec ses dents. Une femelle peut avoir jusqu'à 8 portées par an et jusqu'à 8 petits par portée. **Un couple de campagnols génère 120 individus par an en moyenne** (sources : GRAB et Fredon Occitanie).

Le renard roux a besoin d'environ 500g de nourriture par jour. Il se déplace essentiellement la nuit et reste caché une grande partie de la journée dans son terrier. C'est un chasseur très rusé, extrêmement patient et surtout infatigable. **Il peut consommer 6 000 campagnols par an. Au même titre qu'il existe des solutions favorisant les auxiliaires pour lutter contre les ravageurs en cultures, le renard roux a un rôle positif à jouer dans la lutte contre les campagnols.** En effet l'utilisation de produits rodenticides, tels que la bromadiolone, ont un impact négatif sur la biodiversité au sens large. Notamment par l'ingestion des campagnols empoissonnés, par les espèces prédatrices. Le sanglier peut également consommer les cadavres de campagnols empoisonnés. La bromadiolone agit en empêchant la coagulation sanguine par effet anti-vitaminique K. Elle entraîne ainsi une mort différée des animaux qui l'ingèrent, par hémorragies internes spontanées, puis anoxie (diminution de la quantité d'oxygène que le sang).

Des solutions efficaces existent aujourd'hui pour protéger les élevages de volaille plein air du renard, comme la pose d'une clôture électrique en plus des grillages !

Campagnol des champs *(Microtus arvalis)*

Campagnol terrestre *(Arvicola terrestris)*

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - 05 65 23 22 22

La Chambre d'Agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Égalité Fraternité

Pour recevoir ce bulletin par e-mail, écrivez à : herbe@lot.chambagri.fr

Retrouvez les Bulletins Herbe & Fourrages sur : www.lot.chambagri.fr